vertissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F. C.C.P. Montpellier 5238-12 G

GRANDES CULTURES

N° 7 - 18 décembre 1987

LUZERNE A GRAINES

(en collaboration avec la FNAMS et les SUAD de l'Aude, du Gard et de l'Hérault)

DESHERBAGE DES CULTURES INSTALLEES :

- C'EST LA PERIODE
- A FAIRE SOIGNEUSEMENT, EN BROYANT D'ABORD LA VEGETATION
- * Les conséquences des mauvaises herbes peuvent être très graves :
 - 1) pertes de rendements
 - jusqu'à 2-3 qx/ha (concurrence pour l'eau et les sels minéraux)
 - 2) refus des lots par :
 - impossibilité de triage
- pourcentage excessif de graines indésirables (Ray-Grass, Renouées, Ombellifères, Rumex) qui augmentent le pourcentage de déchets).
- * Désherber c'est choisir une spécialité en fonction :
- l) des travaux culturaux et des dates de semis c'est à dire du <u>DIAMETRE DES RACINES</u>
 - supérieur à 8-10 cm (diamètre d'un crayon) = culture bien développée bien installée
 - inférieur à 8-10 cm = culture peu développée
 - 2) des adventices à détruire

- avec une flore diversifiée : GRAMINEES - DICOTYLEDONES

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal 34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67.92.41.42



P23

Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles - Le Directeur, M. FREYDIER - Nº d'inscription 531 AD © Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.

REPOS VEGETATIF	VEGETATION ACTIVE	SPECIALITES	GRAMI DICOTYLEDONES DOSE/HA
DEC JAN FEV	POUSSES APRES DE 5 cm PRECOUP.	COMMERCIALES	ss. plant minthie minthie ricaire hiendent hiendent

1 - CULTURES BIEN INSTALLEES DIAMETRE DES RACINES SUPERIEUR A 8-10 mm

		1 seul traitement Nomb. SPEC. ** (à base de diuron) + GRAMOXONE 2000; ou TOTACOL	•	Δ Δ	•		0 0	0 0	Δ	Δ Δ	2 + 2
manya sa	23414	2 traitements successifs ** diuron (déc.) puis VELPARS	•	Δ	•	•		•	•	Δ	2 puis
		SINBAR	•	Δ	•	•	•	۵	Δ	Δ	0,8 à 1
IT - and a ALI daos	A'C TE	LEGURAME P.M.	•	0	0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	3,5
		VEGEPRON DS risques de jaunissement)	•	Δ	•	•	•	Δ	Δ	Δ	6 à 8
	inap dage	VELPAR S **	0	Δ		•	•	•	•	0	1
	•	FERVIN + HUILE 11.	•	•	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	1 (à 3+)
	•	FUSILADE + AGRAL 0,5 1. TARGA	•	•	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	1,5 3 (à 3*)

2 - CULTURES PEU DEVELOPPEES (semis sous-couvert printemps 87 ou automne 87) DIAMETRE DES RACINES INFERIEUR A 8 mm

	KERB ULTRA + GRAMOXONE 2000	•	0		Δ	•	Δ	Δ	Δ	1,5 + 2
	KERB ULTRA (seul)	•	0	•	Δ	•	Δ	Δ	Δ	1,5
•	LEGURAME P.M.								Δ	3,5

3 - TRAITEMENTS SPECIFIQUES

RUMEX (au début montaison : stade cigare)	ASULOX	A sperment L	4
CUSCUTE (sur tâches au démarrage)	DACTHAL W 75 + REGLONE 2	0	6 + 2

Efficacité satisfaisante

OEfficacité moyenne

△ Efficacité insuffisante

- * dose efficace contre chiendent rampant
- ** pour cultures très sales